

Aus der Universitäts-Hautklinik Bonn.
Direktor: Professor Dr. Grütz.

ÜBER BROMODERMA TUBEROSUM.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt am 3. Dezember 1936

von

Theodor Löllmann

aus Beilstein a. Mosel.

B O N N 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Grütz.



Meinem lieben Vater!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41552321_0057

Über Bromoderma Tuberosum.

Brom wurde im Jahre 1853 von L o k o k in die Medizin eingeführt, der Bromkalium bei Epilepsie anwandte. Bald aber stellte sich heraus, daß das Brom kein so einwandfreies Arzneimittel war, wie man zunächst angenommen hatte. Bei langdauernder Bromtherapie sah man das Krankheitsbild des Bromismus auftreten, das sich aus verschiedenen Einzelerrscheinungen zusammensetzt, die da sind:

Katarrhe des Respirations- und Digestionstraktus, Appetitlosigkeit, Kachexie; weiterhin werden die Erregbarkeit des Zentralnervensystems, Haut- und Schleimhautreflexe stark herabgesetzt, bzw. können sie völlig verschwinden. Andere Zeichen sind Schluckstörungen, lallende Sprache, taumelnder Gang, Erlöschen der Libido sexualis, Sehstörungen, Muskelschwäche, Verminderung des Intellekts und Störung der Merkfähigkeit. Weiter haben dann in der Folge Martin, Damourette und Elvet zum ersten Male Beobachtungen über Hauterkrankungen nach Bromtherapie beschrieben.

H a n a u führt 1868 einen Fall an von einem kupferfarbenen Bromexanthem an Stirn und behaartem Kopf bei einer 22jährigen an Epilepsie leidenden Pat. Dieses trat auf, nachdem sie innerhalb von zehn Monaten 2 kg Kaliumbromid genommen hatte.

W. S a n d e r behauptet im Jahre 1867, er habe festgestellt, daß fast alle Kranke, die Kaliumbromid in großen Mengen erhalten, an Bromauschlägen, die aus Knötchen und Pusteln beständen, erkranken würden.

Genauer schildert Voisin in einem im Jahre 1868 vor der „Société de Médecin“ gehaltenen Vortrage Hauterkrankungen in Folge von Kaliumbromid-Therapie.

Er unterschied 5 verschiedene Formen:

1. eine akneartige Form,

2. längliche und runde rosen- und kirschrote Geschwülste an den unteren Extremitäten, die an der Oberfläche akneartige Pusteln haben,
3. rote vorspringende Plaques, die in der Geschwulstform, der Farbe und dem harten Grund dem Erythema nodosum gleichen;
4. sehr lästige furunkulöse Eruptionen,
5. ein stark sezernierendes Ekzem an den Beinen.

Damit sind jedoch noch lange nicht alle auf Bromwirkung zurückzuführenden Hautveränderungen genannt.

So beobachtete Thiberge bullöse Bromerytheme und solche von dem Aussehen einer Roseola.

Meyers und Levin haben varicellenähnliche Exantheme beschrieben.

Brocq unterscheidet sogar 11 Formen von Bromauschlägen, und zwar:

Dermatitis e bromo:

1. erythematosä,
2. urticata,
3. papulosa,
4. nodosa,
5. papulo-pustulosa,
6. furunculosa aut anthracoides,
7. ulcerosa,
8. verrucosa aut papillomatosa,
9. vesiculosa,
10. bullosa,
11. squamosa aut sebacea.

Von allen diesen verschiedenen Bromauschlägen kommt die Bromakne am häufigsten vor. Sie ist an denselben Stellen lokalisiert, wo auch die normale Akne vulgaris ihren Sitz hat, nämlich im Gesicht, an der Brust und auf dem Rücken. Doch kommen Bromeffloreszenzen auch an den Extremitäten und an der behaarten Kopfhaut vor.

Von der Akne vulgaris unterscheidet sich die Bromakne durch die viel stärkeren Entzündungserscheinungen. Die Brompusteln sind meist von verschiedener Form und Größe und unterscheiden sich dadurch von der Jodakne, deren Effloreszenzen ein fast ganz gleichmäßiges Aussehen haben und reiner eitrig sind.

Fast immer sind bei Jod- und Bromakne die Entzündungserscheinungen an die Haarfollikel, seltener an die Schweißdrüsen gebunden.

Die Farbe der Bromakne ist dunkelbraunrot im Gegensatz zur Jodakne, die ein mehr hellrotes Aussehen hat.

Weiterhin lassen sich die Bromakneeffloreszenzen wegen ihres weichen und schlaffen Gewebes von anderen Aknearten ziemlich gut unterscheiden. Im Anfangsstadium kann die Eiterung an den Haarfollikeln sehr gering sein, so daß in diesem Falle eine Verwechslung mit einer Akne möglich ist. Doch ist die Bromakne stets stark schmerzhaft. Es handelt sich bei der Bromakne um eine eitrige Follikulitis bzw. Perifollikulitis. Die Bromaknepusteln können konfluieren, so daß größere ulzeröse Prozesse sich bilden.

Tritt bei diesen die Proliferation in den Vordergrund, wobei tumorartige Gebilde neben Ulzerationen entstehen, so sprechen wir nicht mehr von Bromakne, sondern von Bromoderma tuberosum.

Das Bromoderm stellt einen Knoten dar, der mit harten, dunkelbraunen, festhaftenden Borken bedeckt ist, unter denen warzenartige Wucherung sich findet von dunkel- bis violetteroter Oberfläche, die sich wie Samt anfühlt. In den Gewebsspalten findet sich schmutziggelber Eiter, der auf Druck aus allen Poren dringt.

Adler stellte fest, daß das Gewebe einen wabenartigen Bau hat, in dem nur wenig Sekret vorhanden ist. Der scharf begrenzte Herd ist von einem subepidermalen Wulst umrandet, der sich oft weiter in die benachbarte Gegend fortsetzt.

Das Bromoderm entwickelt sich meist langsam nach langdauernder Bromeinnahme, oft aber auch noch, nachdem Brom eine Zeitlang abgesetzt war.

Nach Abheilung bleiben oft ausgedehnte Narben zurück, die

manchmal in Keloide entarten. Oft treten neben dem Bromoderma noch andere Bromeffloreszenzen auf.

Am häufigsten kommt das Bromoderma tuberosum im Gesicht, besonders an der Nase, und an den unteren Extremitäten vor. Es kann aber auch in jeder anderen Gegend auftreten.

Einige Autoren wie Kumer, Nobl, Pulvirenti, Stein und Ettelfen behaupten, daß Bromeffloreszenzen sich gerne auf gereizter und verletzter Haut und in Narben entwickelten.

Bromexantheme sind in den letzten Jahren seltener geworden. In folgendem sei wegen seiner Besonderheit über einen in der Bonner Poliklinik für Hautkrankheiten beobachteten Fall von Bromoderma tuberosum des Kopfes berichtet, der uns von der Provinzialheil- und Pflegeanstalt in Bonn überwiesen wurde, wo der Patient wegen Depressionszuständen etwa ein Jahr lang täglich 1 g Brom in Form der Erlmeyer'schen Bromlösung, die sich folgendermaßen zusammensetzt: Kaliumbromid 4 g, Natriumbromid 4 g, Ammoniumbromid 2 g, kohlen-saures Wasser 600 g, erhalten hatte.

Patient wurde am 2. 1. 34 von einem Pfleger in die Hautpoliklinik gebracht. Von dem Kranken selbst, der an Depressionen litt, war wegen seines psychischen Zustandes keine Anamnese zu erheben. Der Pfleger gab an, daß vor etwa drei Wochen der Patient über starke Schmerzen am Hinterkopf zu klagen begonnen habe. Es sei eine kleine Geschwulst am Hinterkopf zu sehen gewesen; diese hätte sich dauernd vergrößert und zu eitern begonnen. Vor etwa acht Tagen sei eine zweite Geschwulst unterhalb der ersten hinzugetreten, die auch zu eitern anfang. Da man in der Heil- und Pflegeanstalt mit normaler Behandlung auf Geschwüre keinen Erfolg gesehen, sondern das Übel sich dauernd verschlimmert habe, schickte man den Patienten zur Hautklinik. Über die Entstehungsursache wußte der Pfleger nichts zu sagen.

Befund:

72jähriger Patient in schlechtem Ernährungs- und Kräftezustand.

Kopf: normal figuriert, außer den erkrankten Stellen keine Klopf- und Druckempfindlichkeit.

Pupillen reagieren prompt auf Licht und Convergenz. Austrittsstellen von N. V und N. VII frei.

Gebiß in sehr schlechtem Zustand. Nur noch einzelne Zähne intakt.

Zunge leicht belegt, feucht, wird gerade ohne Zittern herausgestreckt.

Rachen ohne krankhaften Befund.

Hals: keine Struma.

Thorax: normal gebaut, Atemexkursionen frei. Verschieblichkeit der Lungengrenzen normal. Auskultatorisch ohne Besonderheiten.

Cor: nach rechts verbreitert, lautes systolisches Geräusch an der Herzspitze.

Abdomen: eingefunken, ganz geringes Fettpolster, weich, zeigt keine Druckempfindlichkeit, keine pathologische Resistenz.

Extremitäten: stark abgemagert, sonst normal.

Genitale: normal entwickelt.

Zentralnervensystem: starker Tremor der Hände, sonst kein krankhafter Befund.

Hautbefund:

Die Hautfarbe des Patienten ist blaß, der Hautturgor allgemein herabgesetzt. Der Patient ist stark behaart. Am Hinterkopf findet sich ein Tumor von der Größe einer kleinen Faust, etwa 5 cm oberhalb ein zweiter, der etwa 8 cm Durchmesser hat. Die Oberfläche erscheint livid verfärbt und papillomatös gewuchert, teilweise von Borken bedeckt.

Die Tumoren fühlen sich weich an und sind von einem ziemlich festen hellrotem etwa 1 cm breitem Wulst umrandet. Aus den Gewebsspalten dringt auf Druck gelblicher übelriechender Eiter. Bei der mikroskopischen Untersuchung des Eiters fanden sich nur Leukocyten. Daraufhin wurde eine Kultur angelegt. Es wuchsen nur Staphylokokken, keine Pilze.

Bei der ersten Vorstellung des Patienten dachte man zunächst, da von Bromtherapie nichts bekannt war, an Kerion Celsi (Trichophytie).

Patient erhielt zur Klärung der Diagnose eine Injektion von Trichophytin 1 : 40 am rechten Vorderarm.

Die Tumoren wurden mit Umschlägen von essigsaurer Tonerde behandelt.

Am 7. 1. 35 hatten sich die tumorartigen Gebilde vergrößert.

Die Trichophytinreaktion war negativ.

Da kein Anhalt für Tuberkulose gegeben und auch Lues anamnestisch auszuschließen war, und erst jetzt bekannt wurde, daß der Patient lange Zeit mit Brom behandelt worden war, lenkte sich der Verdacht auf Bromoderma tuberosum.

Aus dem Tumorgewebe wurde ein Stück excidiert.

Histologische Untersuchung einer Excision vom 22. 1. aus dem Rande des großen Herdes auf dem Kopf:

Die histologische Untersuchung hat zu berücksichtigen, daß die Excision erst etwa 14 Tage nach Absetzen der Brommedication vorgenommen werden konnte, so daß wahrscheinlich schon mit einem Rückgang der histologischen Erscheinungen zu rechnen ist, wie auch das makroskopische Bild vom 22. 1. 35 ebenfalls einen Rückgang des Infiltrates erkennen läßt. Bei einer Übersicht des histologischen Präparates fallen folgende Veränderungen auf: Die Epidermis zeigt von der normalen Grenzpartie nach dem Bromoderm hin eine allmählich zunehmende Verdickung bis zur Akanthose und parallel damit ein anfangs auf die Basalzellen beschränktes, später fast die ganze Dicke des Rete malpighi durchsetzendes inter- und intrazelluläres Ödem und reichliche Durchsetzung mit Leukocyten. Die Haarfollikel sind an der Stelle der teilweise darin fehlenden Haare mit dicken geschichteten Hornmassen ausgefüllt, die stellenweise direkt den Eindruck von Hornzysten erwecken. In den oberen Schichten in der Randzone des Stratum granulosum und des Stratum corneum ist die normale Dicke erhalten, im Bereich des Bromodermas dagegen mit parakeratotischen Auflagerungen durchsetzt. Stellenweise finden sich in diesem Bereich interepitheliale Abzeß-

bildungen. Die weitaus stärksten Veränderungen finden sich im Bereich der Cutis.

Der Papillarkörper weist ein sehr starkes Ödem auf, mit weitgehender Auseinanderdrängung des Bindegewebes und einer auffallenden Gefäßerweiterung, die bis in die tiefen Schichten der Cutis hinabreicht. Weniger die Gefäße der oberen Cutis —, aber sehr ausgesprochen die der mittleren und unteren Cutisschicht zeigen ein starkes perivaskuläres Infiltrat, das aus Lymphocyten und Leucocytenanhäufung besteht und stellenweise aus außerordentlich dichter Plasmazellenanhäufung, die im breiten Saum die Gefäße umgibt. An anderen Stellen ist die Plasmazellenanhäufung spärlicher.

Die Gefäße selbst lassen stellenweise deutlich Endothelwucherungen erkennen. Die Gesamtanordnung der Infiltrate in der Cutis ist keine zusammenhängende, sondern eine herdförmige und läßt überall den Ausgang von Gefäßen erkennen. Das dazwischenliegende Bindegewebe ist stellenweise in lebhafter Neubildung begriffen und sehr kernreich, was insbesondere für die untere Schicht der Cutis zutrifft im Gegensatz zu der oberen Schicht, die von einem beträchtlichen Ödem erfüllt, aber zellarm ist. In den durch starkes Ödem erfüllten Bindegewebpartien ist das elastische Gewebe beträchtlich rarefiziert, stellenweise bis zum völligen Schwund; in den tieferen Partien ist es besser erhalten, ausgenommen im Bereich der beschriebenen herdförmigen Infiltrate, in denen es ebenfalls weitgehend zugrunde gegangen und nur in Trümmern erhalten ist. Riefenzellen fehlen fast ganz. In der Tiefe der Cutis finden sich ab und zu verstreute Haarreste, von wucherndem Bindegewebe umgeben. Talgdrüsen sind nur spärlich vorhanden und scheinen teilweise zugrunde gegangen zu sein. In dem gewucherten Bindegewebe fallen stellenweise Epitheloidzellenanhäufungen neben den reichlich vermehrten Fibroblasten auf.

Im ganzen gewähren die entzündlichen Veränderungen in der Cutis ein sehr polymorphes Bild, das in seiner Vielgestaltigkeit, Zellenreichtum, sowie in der Struktur des Bindegewebes — und Gefäßveränderungen sich von einer banalen Entzündung unterscheidet.

Gans faßt in seiner „Pathologie für Hautkrankheiten“ die für das Bromoderma tuberosum charakteristischen Erscheinungen etwa in Folgendem zusammen: Beim Bromoderm spielen verrucöse Epidermiswucherungen, verbunden mit papillomatösen Bindegewebswucherungen eine Hauptrolle. Als Besonderheiten treten in den Vordergrund die Hyperplasie des Epithels und eitrige Einschmelzung, sowie Wucherung des Bindegewebes. Die Epidermiswucherungen werden durch tiefgehende Spalten und Hohlräume unterbrochen, die zum Teil mit eingedicktem Eiter gefüllt sind, zum Teil mit Bindegewebe durchsetzt werden. Die Epidermis-Papillarkörpergrenze ist durch die epitheloidalen und Bindegewebswucherungen vollständig verwischt. Im Papillarkörper finden sich bisweilen Epithelherde und im Epithel Gewebereste von bindegewebiger Abkunft. Im Papillarkörper sind die Lymphgefäße und Gewebespalten infolge des Ödems erweitert. In der Epidermis führt es zu umschriebener Parakeratose. Die Epithelleisten wachsen mit benachbarten zusammenfließend in atypischer Sprossung und unregelmäßigen Zellformen als mächtige Epithelmassen in die Breite und Tiefe. Die Hornschichten über den gewucherten Epithelmassen sind meist stark verbreitert.

Die Haarfollikel sind ampullenförmig erweitert, selten auch die Schweißdrüsenausführungsgänge. Diese sind von abgestoßenen Hornmassen, Eiterkörperchen, zerfallenden Epithelien und Talgreften erfüllt. Das perifolliculäre Gewebe ist infiltriert, die Blutgefäße in der Umgebung erweitert und mit Leukozyten erfüllt. Die Talgdrüsen vielfach atrophisch. Das Infiltrat besteht aus teils zerfallenden Leukozyten, aus größeren und kleineren Lymphozyten, aus eosinophilen und vereinzelt Plasmazellen. In diesem infiltrierten Gebiete Schwund des elastischen und kollagenen Gewebes. Innerhalb des Infiltrates und nächster Umgebung sind kleine umschriebene Abszesse, außerdem Epidermiscysten, teils leer, teils mit konzentrisch angeordneten Hornmassen erfüllt. Manchmal stehen diese noch mit den äußeren Hornschichten in Verbindung, manchmal liegen sie als vollkommen abgeschlossene mit einem dicken, wuchernden Epithelfaum umgebene Horncysten in der Tiefe.

Soweit Gans.

Der von uns erhobene histologische Befund deckt sich, wie aus dem Bericht hervorgeht, zum größten Teil mit der Beschreibung von Gans.

Diagnose:

Aus der Anamnese, dem klinischen und histologischen Befunde und schließlich aus dem Erfolge der Therapie ergibt sich, daß es sich in unserem Falle nur um Bromoderma tuberosum handeln kann.

Behandlung: Die Brombehandlung wurde sofort am 7. 1. 35 abgesetzt und lokal nur indifferent mit trockenem Verband behandelt. Bei der Untersuchung am 16. 1. 35 sahen wir an der Stelle, wo vorher die Tumoren waren, Ulcera mit gelblich schmierigem Grund. Nur am Rande noch starke Wucherungen. Die Ulcerationen sonderten anfangs immer noch Eiter ab, doch gingen sie langsam völlig zurück. Ebenso fielen die tumorartigen Ränder mehr und mehr ein.

Aus den beiliegenden Photographien, die in Abständen von 14 Tagen bis 3 Wochen gemacht wurden, ist deutlich das Zurückgehen des Krankheitsprozesses zu erkennen. Anfang März war das Bromoderm vollkommen abgeheilt.

Epikrise: Wie aus dem Krankenbericht ersichtlich, war die Diagnose „Bromoderma tuberosum“ nur möglich auf Grund einer eingehenden Anamnese und dadurch, daß wir alle ähnlich aussehenden Hautaffektionen ausschließen konnten.

Das Krankheitsbild hatte etwa das Aussehen einer tiefen Trichophytie. Bei der Untersuchung des Eiters fanden sich jedoch keine Pilze. In der angelegten Kultur wuchsen nur Staphylokokken. Auf eine intracutane Injektion von Trichophytin 1:40 reagierte der Patient nicht. Somit war eine Trichophytie auszuschließen. Tuberkulose und Lues kamen anamnestisch und nach dem klinischen Verlauf nicht in Frage.

Erst bei der zweiten Vorstellung des Patienten erfuhren wir, daß er circa 13 Monate Brom erhalten hatte und auch noch bekomme wegen seines psychischen Zustandes, und zwar 1 g pro die.

Auf Grund dieser neuen Feststellung tauchte nun der Verdacht auf, daß die erwähnten trichophytieähnlichen Hautaffektionen des Kopfes mit diesem so lange Zeit fortgesetzten Bromgebrauch in ursächlichem Zusammenhang stehen könnten, und daß es sich hier um einen der seltenen Fälle von „Bromoderma tuberosum“ handele.

Natürlich suchte ich nach einer Bestätigung und Erhärtung der Diagnose. Der Urin des Kranken wurde am 10. Februar, leider erst mehrere Wochen nach Aufhören der Brommedikation im hiesigen pharmakologischen Institut untersucht. Brom wurde im Urin noch nachgewiesen, obwohl das Medikament dem Patienten bereits 4 Wochen lang nicht mehr verabreicht worden war.

In manchen Fällen kann die Diagnose durch eine funktionelle Hautprüfung mittels der äußeren Anwendung von Brom geklärt werden. So berichtet Lipp über positive Hautreaktionen bei äußerlicher Anwendung von 50%iger Natriumbromid-Lösung bei einem Fall von Bromexanthem, Scholz-Sanderbeck über positive Hauttests bei einem Fall von Bromoderm.

Venturi schildert einen Fall von Bromakne, bei dem Intracutanproben von wässrigen Lösungen von Natriumbromid und Hautreaktionen mit pulverisiertem Natriumbromid positiv ausfielen.

Die gleichen Versuche mit demselben Resultat machten Manuiloff, Soroka und Wolffohn. Sehr interessant sind in dieser Hinsicht die Versuche von Bloch und Tenchio an einem schweren, letal endenden Fall von Bromoderma.

Injektionen von Kaliumbromid-Lösung zeigten keine besondere Wirkung. Nach einer Einreibung von Kaliumbromidvaseline 30% entstand nach 24 Stunden bereits entzündliche Reizung an der Applikationsstelle. Am 3. Tag wurde bereits Pustelbildung mit rotem Hof beobachtet. Am 6. Tage hatte sich die Pustel mit einer Kruste bedeckt. Einige Tage später war an der betreffenden Stelle

ein tumorartiges Gebilde von papillärem Bau, von Krusten bedeckt, das vollkommen dem Bilde eines Bromoderms entsprach, entstanden.

Auch histologisch war das entstandene Gebilde mit einem Bromoderm identisch. Bei demselben Patienten wurden weiterhin Versuche mit intracutanen Injektionen von Kaliumjodid-Lösung 1,988% gemacht.

Auch hier entstand innerhalb von 24 Stunden eine Rötung, woraus sich in einigen Tagen eine Pustel entwickelte, in deren Zentrum sich eine Kruste bildete, und nach einem Monat war ein haselnußgroßer Tumor von ziemlich derber Konsistenz, verrucöser, schmutzig-grauer Oberfläche entstanden. Genau wie 30%ige Kaliumbromid-Vaseline wirkte auch die 30%ige Kaliumjodid-Vaseline.

Bei den Kontrollpersonen entstanden nur kleine Pusteln, die schnell abheilten.

Der Patient reagierte ebenso auf fluorhaltige Substanzen, weiterhin auf Cantharidenpflaster und auf Auftragen von Natriumkarbonat in Vaseline-Lanolin aa auf scarifizierte Haut.

Weiterhin entstanden auch in Excisionsnarben bromodermartige Tumoren. Es führten also alle Eingriffe in die Haut des Patienten, die zu einer stärkeren Entzündung führten, gleichgültig ob äußerlich Brom appliziert wurde oder nicht, zur Bildung von Effloreszenzen, die mit den spontan entstandenen Bromodermaeffloreszenzen im Verlauf, Aussehen und histologischen Bau identisch waren.

Nur nach Chlorapplikation, bei der keine Hautreizung sich zeigte, entstanden keine Tumoren.

Ähnliche Versuche machten an dem St. Lazarus-Krankenhaus in Warschau Robert Bernhard und Karl Potrzebowski im Jahre 1924.

Es handelte sich um einen Fall von Bromoderma acneiforme et tuberosum. Die 46 jährige Kranke S. K. litt seit Jahren an Herzneurose und wurde ab und zu mit Brom- und Baldrianpräparaten behandelt. Während des letzten Jahres nahm sie täglich 2 Eßlöffel einer Kalumbromid-Lösung.

Seit zwei Monaten Hauterkrankung.

Zerstreutes, reichliches Exanthem an Gesicht und Extremitäten, wobei im Gesicht und an den Schultern hauptsächlich Acne-bromata-Effloreszenzen, an den Vorderarmen und an den Beinen Knoten und warzenartige Gebilde zum Vorschein kommen. Manche größeren Knoten mit Borken, andere mit Schuppen bedeckt.

Innere Organe ohne Befund.

Epidermale Lämpchenproben mit 10 und 20%iger Kaliumbromid-Salbe, sowie mit Primel, Arnica, Reforcin, Sublimat und Formalin waren negativ.

Dagegen entstand bei intracutaner Injektion von Staphylokokkenvaccine und Streptokokkenvaccine eine leichte Hautreaktion in Form einer umschriebenen Rötung; bei Injektion von 0,2 ccm einer 1%igen Kaliumbromid-Lösung entstand eine stärkere, bei Injektion von 0,2 ccm einer 2%igen Kaliumbromid-Lösung eine sehr starke Hautreaktion. Eine intrakutane Injektion von 0,2 ccm einer 3%igen Kaliumbromid-Lösung hatte die gleiche Wirkung wie die 1%ige Kaliumbromidlösung.

Die Reaktion war erythematös und acneiform, am stärksten also bei einer 2%igen Kaliumbromid-Lösung.

Es wurde eine 5 Tage alte, nach Injektion von 0,2 ccm einer 2%igen Kaliumbromid-Lösung entstandene Effloreszenz exzidiert. Die Veränderungen betreffen Haut und Oberhaut.

Der Zentralteil der Effloreszenz umfaßt einen Raum, dessen Durchmesser der Entfernung zweier Haarfollikel entspricht. In der Epidermis eine Blase von ovaler Form, die am Rande des einen Haarfollikels beginnt und am Rande des zweiten endet, so daß die Follikel in die Blashöhle münden und teilweise ihren Grund bilden. Die Blasendecke ist aus einer dünnen Hornschicht und aus 2 bis 3 Lagen plattgedrückter Epidermiszellen gebildet, die sich normal färben.

Im Blaseninhalt fand sich eine amorphe, feinkörnige Masse, polynucleäre Leukozyten und Epidermiszellen.

Den Blasengrund bilden einige Lagen flacher viereckiger Epidermiszellen, die in den oberen Schichten locker miteinander ver-

bunden sind, stellenweise frei werden und in die Blashöhle treten. Die Epidermis-Cutisgrenze tritt deutlich zutage und verläuft leicht gewellt. Der Papillarkörper ist ödematös geschwollen. In der subpapillären Schicht, tief in die Cutis reichend, dichtes Zellinfiltrat, hauptsächlich aus polynucleären Leukozyten, teils aus eosinophilen, sowie aus einzelnen Mastzellen zusammengesetzt. Das Infiltrat ist meist zerstreut und herdförmig in den zentralen Partien des Knötchens, wo es die gequollenen Bindegewebsbündel und die erweiterten Blutgefäße umgibt. Reichliche und diffuse Infiltrate rings um die Haarfollikel und Talgdrüsen. Hier dringt das Infiltrat zwischen den Drüsenläppchen ein, bringt sie teilweise zum Schwunde und tritt in kleinen Herden im Haarfollikel hervor, in dessen Scheiden inter- und intrazelluläres Ödem. In den tieferen Lagen der Cutis stellenweise geringes perivaskuläres Infiltrat.

In dem erythematösen Hofe, der die acneiforme Effloreszenz umgibt, in der Epidermis interzelluläres Ödem, wobei die interpapillären Leisten stellenweise leicht ödematös und etwas verlängert sind. Hier und da einzelne Leukozyten. Im Papillarkörper und in den oberen Cutisschichten ist das Bindegewebe deutlich geschwollen, die Blutgefäße erweitert und mit roten Blutkörperchen gefüllt, die Endothelien gequollen und mit einem schmalen Infiltrationsmantel umgeben.

Dann wurde zum Vergleich ein Hautstück einer gefundenen Kontrollperson, der man ebenfalls Kaliumbromid-Lösung 0,2 ccm 2%ig, injiziert hatte, untersucht. Ein vier Tage alter graurötlicher Fleck, der nach dieser Injektion entstanden war, wurde excidiert.

In der Epidermis zeigten sich keine wesentlichen Abweichungen von der Norm. Im Papillarkörper geringes Ödem. In der Cutis, besonders in den oberen Lagen, sind die Blutgefäße stellenweise etwas erweitert und von spärlichem Infiltrat umgeben. Es besteht hauptsächlich aus neutrophilen Leukozyten und einer geringen Zahl von Lymphozyten, Bindegewebs- und Pigmentzellen. Haarbälge, Talg- und Schweißdrüsen sind normal.

Aus diesen histologischen Verschiedenheiten sehen wir also wieder, daß eine Person, die lange Zeit Brom in großen Dosen er

halten hatte, anders reagierte als eine Person, die kein Brom bekommen hatte.

Interessant ist, daß die künstlich erzeugten Bromeffloreszenzen den spontan entstandenen in jeder Hinsicht identisch waren. Läppchenproben hatten hier keinen Erfolg. Es scheint, daß eine mechanische Gewebsschädigung für das Entstehen von Bromeffloreszenzen prädisponierend wirkt.

Weiter könnte man annehmen, daß eine bestimmte Konzentration von Brom im Gewebe für das Entstehen von Entzündungsreaktionen erforderlich ist.

Vielleicht erklärt sich damit auch die Tatsache, daß in Excisionsnarben von Bromeffloreszenzen neue Entzündungserrscheinungen von derselben Art der spontan entstandenen sich bilden. Man könnte annehmen, daß in diesem Falle schon die bestimmte Konzentration im Gewebe gegeben ist, bei der nach Hautschädigung eine ganz andersartige Reaktion entsteht als bei einem Gewebe, das keinen Bromgehalt aufweist.

Ich machte nun folgenden Versuch:

Am 2. Febr. 35 legte ich dem Patienten Läppchenproben mit 10- und 30%igem Kaliumbromid und 10 und 30%igem Kaliumjodid auf. Nach 24 und 48 Stunden zeigte sich keine Reaktion.

Darauf machte ich dem Patienten intracutane Injektionen in den linken Unterarm und zwar mit je 0,2 ccm einer 1%-, 2%- und 3%igen wässrigen Kaliubromid-Lösung.

Als Kontrollperson diente ich selbst. Es zeigte sich keine Reaktion der Haut, weder beim Patienten noch bei mir.

Am 22. Februar machte ich nun dem Patienten wieder Injektionen am rechten Unterarm und zwar mit 0,1 ccm einer 10%igen, einer 20%igen, einer 30%igen und einer 50%igen Kaliumbromid-Lösung.

Auch hier diente ich selbst wieder als Kontrollperson.

An der Injektionsstelle der 50%igen Kaliumbromid-Lösung trat im Verlauf einer Minute bei dem Patienten eine etwa erbsengroße Rötung auf.

Nach 24 Stunden zeigte die Injektionsstelle der 10%igen Kali-

umbromid-Lösung dieselbe Rötung wie bei der 50%igen Lösung. An der Injektionsstelle der 20%igen Kaliumbromidlösung war die Rötung der Haut geringer. Eigenartigerweise zeigte sich an der Injektionsstelle der 30%igen Lösung überhaupt keine Reaktion.

In der Folgezeit bieten die Injektionsstellen ungefähr daselbe Bild. Sie sind nur etwa ins Bläuliche verfärbt. Von einer spezifischen Reaktion im Sinne einer Bromacne oder gar eines Bromoderms kann also hier nicht die Rede sein.

Merkwürdig jedoch ist die Tatsache, daß diese Hautveränderungen noch nach zwei Monaten sichtbar waren, während das Bromoderm des Kopfes bereits Anfang März völlig abgeheilt war.

K o n t r o l l e :

Die wieder bei mir selbst gemachten Injektionen zeigten alle nur eine leichte Rötung an den Injektionsstellen, die etwas Schmerzen verursachten, die aber bald wieder verschwanden ohne eine Spur zu hinterlassen.

Also ist immerhin ersichtlich, daß der Patient bei der intracutanen Verabreichung einer entsprechenden Dosis Kaliumbromid anders reagierte als ich selbst. Eine geringe Überempfindlichkeit gegen Brom war also noch vorhanden, nachdem Brom bereits einen Monat abgesetzt war.

Nimmt man, wie schon erwähnt, eine bestimmte Konzentration im Gewebe, bei der durch Hautreizung starke, meist proliferative Entzündungsprozesse entstehen, als erforderlich an, so kann man sich auch erklären, warum in dem von mir beobachteten Fall bei 1%- , 2%- und 3%iger Kaliumbromid-Lösung keine, jedoch bei 10%iger Kaliumbromid-Lösung schon eine Reaktion im Sinne einer Bromeffloreszenz in Form einer umschriebenen Rötung auftrat, wenn sie auch bei weitem nicht an die spontan entstandenen Effloreszenzen heranreichte.

Weiterhin scheint die Haut an verschiedenen Stellen verschiedene Empfindlichkeit zu zeigen (L o k a l e D i s p o s i t i o n).

Trat doch auch bei Injektion von 0,1 ccm 50%iger Kaliumbromid-Lösung 20 cm oberhalb der Injektionsstelle von 10%iger

Kaliumbromid-Lösung faßt die gleiche Reaktion auf wie bei der 10%igen Kaliumbromid-Lösung.

Außerdem scheint die allgemeine Sensibilisierung ein wichtiger Faktor für das Entstehen von Bromodermatosen zu sein.

Ich unternahm die Versuche, nachdem die Bromtherapie bei dem Patienten schon einige Wochen abgesetzt war, und die spontan entstandenen Bromodermknötchen ohne jegliche lokale Therapie schon deutlich in der Rückbildung begriffen waren.

Die allgemeine Sensibilität war in diesem Falle wahrscheinlich nicht mehr so groß; daher die bedeutend geringere Reaktion.

Eines kann wohl mit Sicherheit gesagt werden, nämlich daß die intracutanen Injektionen von Bromlösungen, vor allem von Kaliumbromid in verschiedenen Konzentrationen in den Fällen, wo der Verdacht einer Hautschädigung durch Brom vorliegt, ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel darstellen. Weiter ist, wie wir schon gesehen haben, der Nachweis von Brom im Urin sehr wertvoll, besonders in den Fällen, bei denen Bromgebrauch aus der Anamnese nicht hervorgeht.

Es ist aber zu berücksichtigen, daß bei der Dermatitis herpetiformis auch eine Überempfindlichkeit gegen Brom und Jod besteht.

Wir sehen, daß die Diagnose Bromoderma tuberosum oft recht schwierig sein kann. Eine Verwechslung zwischen Bromoderm und Jododerm ist nicht so leicht möglich. Das Bromoderm neigt weit mehr zur Vereiterung als das Jododerm und ist polymorpher als dieses; weiter ist das Bromoderm im Gegensatz zum Jododerm ungleich schmerzhafter. Die trichophytiähnlichen Formen des Bromoderms kann man durch den fehlenden Pilzbefund und die negative Trichophytinreaktion von der Trichophytie trennen.

Schwieriger ist die Differentialdiagnose gegen Tuberkulose. Hier sind die bakteriologischen und histologischen Untersuchungen entscheidend, sowie die schon erwähnten intracutanen Injektionen mit Kaliumbromid-Lösung, die Urinuntersuchung auf Brom und genaueste Anamnese.

Auch die Lues kann das Bild eines Bromoderms nachahmen, bzw. kann das Bromoderma tuberosum das Aussehen einer luetischen Hautaffektion haben.

In früherer Zeit, da man die Wassermannsche Reaktion und die übrigen spezifischen Reaktionen noch nicht kannte, kamen tatsächlich Verwechslungen vor. Ein Beispiel, wie schwer die Diagnosestellung früher einmal war, zeigt der in der Arbeit „Casuistik des Bromexanthems“ mitgeteilte Fall von K. S z a d e k (Kiew) im Jahre 1888.

Es handelte sich um einen Patienten, der sich vor einer längeren Reihe von Jahren luetisch infiziert hatte. Wegen hochgradiger Neurasthenie nahm er Brom in großen Dosen. Ein sehr verbreitetes, tuberöses Exanthem, das sich bei ihm einstellte, wurde für luetisch gehalten, demgemäß behandelt — aber ohne Erfolg. Der Patient kam dabei außerordentlich körperlich und geistig herunter.

S z a d e k stellte die Diagnose auf Bromexanthem, und nachdem demgemäß Brom weggelassen war, besserte sich der Zustand des Patienten außerordentlich schnell.

Weiter haben W h i t e h o u s e und F o r d y c e über Bromodermformen berichtet, die das Bild von Sarkomen und Mykosis fungoides darboten.

Hier kann eine Probeexcision und histologische Untersuchung des excidierten Hautstücks Klarheit schaffen.

Die Abgrenzung gegen die besonders in Amerika vorkommende Blastomykose ist durch den fehlenden Pilzbefund verhältnismäßig leicht.

Einen interessanten Fall von Bromoderma schildert auch C o l c o t t F o x in „Brit. Journ. of Derm. 1892“.

Bei einem sechs Monate alten Kinde, das seit der Geburt vollständig gesund gewesen, wurde eine starke Hauteruption bemerkt, die zunächst auf die vor 1½ Monat stattgehabte Vaccination zurückgeführt wurde. An den Wangen befanden sich neben isolierten miliaren Pusteln auch Knötchen von verschiedener Größe, zum Teil mit dicken Krusten bedeckt. Es bestanden kein Fieber, keine konstitutionellen Störungen; jedoch war das Kind blaß und schrie sehr

viel. Als Ursache ergab sich fortgesetzter Bromabusus der Mutter, welche das Kind selbst stillte. Nach Absetzen der Brommedicaion bei der Mutter baldige Abheilung der Hautaffektion beim Kinde.

Hier sehen wir wieder, daß nur durch eine genaue Anamnese eine richtige Diagnofeststellung ermöglicht wurde. Nach welchen Dosen von Brom tritt das Bromoderma tuberosum nun auf? Gibt es weiterhin eine angeborene Überempfindlichkeit gegen Brom?

Da in der gesamten Literatur, wie schon erwähnt wurde, kein Fall bekannt ist, wobei ein Patient nach einmaligem Bromgebrauch an einer Bromdermatose erkrankt wäre, so können wir eine angeborene Überempfindlichkeit gegen Brom wohl ausschließen. Die Intoxikationserfcheinungen treten stets erst nach einiger Zeit auf, während der Brom genommen wurde. Die Ausscheidung von Brom setzt zwar rasch ein, geht aber dann langsam vor sich. Nach 24 Stunden ist nur ein Zehnte l bis ein Viertel der eingeführten Brommenge im Harn nachweisbar. Große Mengen von Brom werden lange Zeit im Organismus festgehalten. Die ausgeschiedene Brommenge steigt täglich, bis schließlich soviel Brom täglich ausgeschieden wie zugeführt wird. Im Körper vermag Brom das Chlor aus seinen Verbindungen unter gewissen Umständen zu verdrängen und umgekehrt.

Dies ergibt sich aus der Tatsache, daß bei erhöhter Natriumchlorid-Zufuhr eine größere Menge Brom als normalerweise ausgeschieden wird. In dem Falle, wo Brom-Zufuhr und -Ausfuhr gleich sind, können wir von einem Brom-Chlor-Gleichgewicht sprechen.

Im Bromoderm sind von vielen Autoren und auch in dem von mir beobachteten Falle Staphylokokken gefunden worden.

Haxthausen und Milian behaupteten, daß gar nicht das Brom, sondern die Staphylokokken es seien, die zur Entstehung des Bromoderms führten. Die Arbeiten von Bloch und Tension bringen uns hier einen Schritt weiter.

Aus ihren Versuchen geht hervor, daß jeder starke auch bromlose Eingriff in die Haut des Patienten, der an Bromoderm er-

krankt war, eine entzündliche Reaktion im Sinne einer Bromdermatose zur Folge hatte.

Daraus ergibt sich, daß die Haut ihres Patienten allgemein eine größere Empfindlichkeit gegen Schädigungen irgendwelcher Art befaß, als die Haut anderer Menschen. Diese größere Empfindlichkeit der Haut des Patienten gegen mechanische Schädigungen konnte nur durch das im Körper retinierte Brom gegeben sein. Daß jedoch bei Applikation von Chlor-Verbindungen bei gleichzeitiger Hautschädigung keine Reaktion sich zeigte, läßt vermuten, daß durch das Chlor die Brom-Wirkung aufgehoben wurde.

Es scheint also tatsächlich, daß das im Körper vorhandene Brom die Widerstandsfähigkeit der Haut gegen Schädigungen herabsetzt. Die normale Resistenz gegen Hautschädigungen ist aber dann wieder vorhanden, sobald das Brom aus dem Gewebe wieder entfernt ist.

Wie schon vorher erwähnt, scheint die Bromkonzentration im Körper und auch im Hautgewebe bei diesen Verhältnissen eine wichtige Rolle zu spielen.

Die an dem Warschauer St.-Lazarus-Krankenhaus von Robert Bernhard und Karl Potrzebowski mit intracutanen Injektionen von Kaliumbromid an einer an Bromoderm leidenden Patientin gemachten Versuche zeigten die stärkste Reaktion, wenn eine 2%ige Kaliumbromid-Lösung injiziert wurde.

Diese beiden Forscher nehmen an, daß die 2%ige Kaliumbromid-Lösung die Antigenkonzentration sei, die intracutan injiziert, bei durch Bromabusus geschädigten Personen Bromdermatosen hervorrufen würde.

Diese Annahme steht nun in Widerspruch zu den von mir gemachten Versuchen und den daraus gewonnenen Resultaten.

Bei intracutanen Injektionen von 1%-, 2%- und 3%iger Kaliumbromid-Lösung entstand bei dem von mir beobachteten Falle keine Reaktion. Erst bei Injektionen von 10%, 20%- und 50%iger Kaliumbromid-Lösung zeigten sich entzündliche Reaktionen

In unserem Falle ist also eine weit höhere Konzentration der Kaliumbromid-Lösung erforderlich, um eine Hautreaktion hervorzurufen als bei dem im Warschauer Krankenhaus S. Lazarus berichteten Fall.

Bei dem von Bloch und TENCHIO mitgeteilten Fall genügten schon rein mechanische Schädigungen der Haut, um bromodermartige Effloreszenzen hervorzurufen.

Bei allen diesen Fällen ist es sicher, daß die betreffenden spontan entstandenen Hauteruptionen durch den Bromabusus bedingt waren.

Bei allen Kontrollpersonen waren die Versuche, künstlich Bromeffloreszenzen zu erzeugen, erfolglos.

Daraus kann man den Schluß ziehen, daß eine allgemeine Sensibilisierung gegen Brom bei den an Bromoderm erkrankten vorhanden war.

Wie ist es nun zu erklären, daß der eine Fall schon auf Hautschädigungen rein mechanischer Art, der andere bei Injektionen von 2%iger Kaliumbromid-Lösung am besten und der von mir beobachtete Fall erst bei Injektion von 10%iger Kaliumbromid-Lösung reagierte?

Ich deutete die Ergebnisse folgendermaßen:

Bei Bloch und TENCHIO handelte es sich um einen sehr schweren letal endenden Fall. Bei diesem war stets eine genügende Bromsättigung des ganzen Körpers und des Hautgewebes vorhanden.

In dem von POTROBOWSKI aus Warschau berichteten Fall hören wir, daß Läppchenproben auf der Haut verfielen, dagegen schon bei intracutaner Injektion von 1%iger Kaliumbromid-Lösung Entzündung auftrat.

Zur Erklärung dieses Verhaltens läßt sich folgendes annehmen:

Die Bromsättigung des Gewebes war bei dem letztern Fall nicht genügend groß, so daß erst durch künstliche Erhöhung des Bromgehalts in der Haut mittels intracutaner Injektionen von Kaliumbromid diejenige Sättigung des Gewebes mit Brom erreicht war, bei der entzündliche Reaktionen eintreten. Bei unserem Bonner Fall

war, wie schon betont, Brom bereits über vier Wochen abgesetzt, und die Bromodermknötchen, wie aus beiliegenden Photos ersichtlich, bedeutend in Regression begriffen. Es war also bestimmt nicht mehr die ursprüngliche Sensibilität gegen Brom vorhanden. Um das Gewebe wieder empfindlicher zu machen, mußte schon eine weit höhere Bromdosis, in diesem Fall 0,1 ccm einer 10%igen Kaliumbromid-Lösung, intracutan injiziert werden. Trotzdem war die entstandene Reaktion nur gering. Dies mag wohl dadurch bedingt sein, daß die allgemeine Empfindlichkeit des Körpers bedeutend geringer war.

Daß die Injektionsstelle der 20%igen Kaliumbromid-Lösung weniger stark, die der 30%igen gar nicht, und die der 50%igen wieder wie die der 10%igen reagierte, mag durch örtliche Empfindlichkeitsunterschiede bedingt sein.

Man wird nämlich außer der allgemeinen noch eine lokale Disposition annehmen müssen, die an verschiedenen Körperstellen sich verschieden verhält.

Auf andere Weise sind die verschiedenen Reaktionsgrade bei diesem Versuche kaum zu erklären.

Nimmt man außer der allgemeinen Sensibilisierung noch das Bestehen lokaler Dispositionsverschiedenheiten an, so ist es für uns kein Rätsel mehr, warum in dem Falle Bloch und Tencios einmal bei bloßer Verletzung der Haut bromodermähnliche Hauteruptionen entstanden, während bei intracutaner Injektion von einer 1,425%igen Kaliumbromid-Lösung sich keine Reaktion zeigte. Weiter kann man sich vorstellen, daß die Intensität der Reaktion mit abhängig ist von der Stärke der mechanischen Reizung des Gewebes. Diese mechanische Reizung kann auch durch ätzend wirkende Stoffe, wie z. B. Cantharidenpflaster, die die Haut schädigen, bedingt bzw. verstärkt werden.

Wie kann man sich nun den Wirkungsmechanismus der Bromverbindungen auf die Haut vorstellen?

Allgemein nimmt man an, daß es das im Körper freiwerdende Brom-Ion sei, das die gewebeerstörende Wirkung hervorruft.

Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, daß gerade die

Salze, die viel Brom als Jon abspalten können, viel leichter Bromdermatosen hervorrufen als solche mit geringem Bromgehalt.

So stellte H o l s t e i n im Anschluß an einen vorgestellten Fall (Brocklin Dermatological and Genito-Urinary Society 1895), in welchem ein Kind vor Ausbruch des Hautauschlags 3 bis 4 Tage lang 0,6 g Ammoniumbromid, das 82% Brom enthält, erhalten hatte, fest, daß seiner Erfahrung nach die Ammoniaksalze des Broms leichter als die anderen einen Ausschlag hervorrufen würden. Beachtlich ist jedenfalls der Umstand, daß im Gegensatz zu den anorganischen Bromverbindungen bei organischen selten Hautschädigungen beobachtet worden sind. Auf diese Tatsache hat schon R i t t e r in der Berliner Kl. Wochenschrift 1903 hingewiesen gelegentlich der Erkrankung eines 7jährigen Knaben an tuberösem Bromexanthem nach Darreichung von Bromoform.

Er erklärte, daß er bei 4000 von ihm mit Bromoform behandelten Kindern nur siebenmal eine Nebenwirkung auf die Haut gesehen habe.

Normalerweise spalten die organischen Bromverbindungen im Organismus kein freies Brom ab. Es gelangt als Alkalibromid oder in organischer Verbindung im Urin zur Ausscheidung.

Es ist wohl möglich, daß solche, durch Brom in ihrer chemischen Struktur entgegen der Norm veränderten Zellen anders reagieren als solche, deren chemische Zusammensetzung normal ist. Die durch das Brom veränderten Zellen reagieren viel leichter und auf bedeutend geringere Reize, ob chemischer oder mechanischer Natur, proliferativ entzündlich, da bereits eine Schädigung der Zellen gesetzt und damit ihre normale Funktion geändert ist.

Wir müssen demnach annehmen daß, wenn die Zellen eines Gewebes eine bestimmte Menge Brom enthalten, sie zu proliferativer Entzündung neigen, andererseits, daß die Empfindlichkeit der Zellen untereinander gegen Bromeinwirkung aber verschieden sein dürfte.

Wie der von mir beschriebene Fall lehrt, könnte die lokale Überempfindlichkeit gegen Brom künstlich durch Einverleibung einer Bromlösung in die Haut gesteigert werden.

Wir haben gesehen, daß es bei allen Versuchen nur dann möglich war durch künstliche Einverleibung von Brom in die Haut Bromeffloreszenzen hervorzurufen, wenn die betreffende Person lange Brom genommen hatte. Da das Brom sehr langsam ausgeschieden wird, war der Bromgehalt der Gewebe vermutlich hoch. Es läßt sich annehmen, daß, wenn man durch Injektion einer Bromlösung in die Haut eines Menschen, dessen Gewebe schon mit Brom beladen sind, die Bromkonzentration in einem bestimmten Zellverband erhöht, diese auch länger bestehen bleibt als bei einem Menschen dessen Gewebe nicht schon mit Brom angereichert sind.

Bei einem gefunden Menschen wird das Brom auf dem Blut- und Lymphweg weggeschafft werden, so daß die künstlich erzeugte örtliche Erhöhung des Bromgehaltes nur von kurzer Dauer ist. Wir sehen also, daß es nicht genügt den Bromspiegel nur einzelner Geweb-Anteile zu erhöhen, sondern daß ein allgemein erhöhter und längere Zeit hindurch bestehender Bromspiegel nötig ist, damit Bromdermatosen entstehen können.

Ein Hinweis dafür, daß bei allgemeiner Disposition letzten Endes Gewebsbeanspruchungen den Anstoß zur lokalen proliferativen Gewebsentzündung geben, ist die normale Lokalisation des Bromoderms. Meist finden wir es ja an den Extremitäten, an der Nase und am Hinterhaupt, an Stellen also, die starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

Wir wissen, daß manche Menschen schon bei verhältnismäßig geringen, andere dagegen erst bei höheren Bromdosen erkranken. Daß bei Störungen der Nierenausscheidung es sehr leicht und früher als sonst zu Bromschädigungen der Haut kommt, ist schon lange bekannt. Auch ist erwiesen, daß Patienten zu verschiedenen Zeiten verschieden reagieren.

Daß ein Geschlecht mehr befallen ist als das andere, ist bisher nicht erwiesen.

Dagegen gibt uns aber die Tatsache zu denken, daß von allen Brustkindtoxikodermien der weitaus größte Prozentsatz Bromschädigungen sind. Unter 20 Fällen, die Erich Hoffmanns Schüler

Jos. S e n d im Jahre 1919 sammelte, betreffen 16 Bromexantheme, unter ihnen eine Anzahl von schweren wuchernden Formen.

Toxikodermien sind bei Kindern schon allgemein selten, da man ja mit Arzneiverordnung bei schwangeren und stillenden Frauen sehr vorsichtig ist und selten Brom gegeben wird.

Daß aber, wie H o f f m a n n berichtet, ein Kind mit Brom-effloreszenzen geboren wird, während bei der Mutter keine Zeichen einer Bromintoxikation gegeben sind, könnte vielleicht durch das schlechte Ausscheidungsvermögen des Fötus bedingt sein.

Es gibt auch viele Fälle von Bromdermatosen bei Brustkindern, deren Mutter erst post partum Brom erhielten, selbst aber nicht erkrankten. Dem Kinde wird durch die Muttermilch aber doch nur eine ganz geringe Menge Brom zugeführt.

Dies berechtigt wohl zu der Annahme, daß der Organismus des Säuglings bedeutend empfindlicher gegen Brom ist als der der Mutter.

Sicher vermögen die Körperzellen des Kleinkindes Bromschädigungen schlechter zu ertragen als die Zellen des Erwachsenen. Ein Faktor, warum ein Organismus leichter auf Brom mit proliferativer Entzündung reagiert als ein anderer, stellt wohl das verschiedene Ausscheidungsvermögen dar. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß dies der einzige ist. Jedenfalls wissen wir daß die Konstitution gegenüber Bromabusus sich verschieden verhält sowohl zwischen den einzelnen Individuen als auch bei demselben Individuum zu verschiedener Zeit. Wahrscheinlich spielt der augenblickliche Zustand der Zelle, bei dem sie von der Bromschädigung betroffen wird, auch eine Rolle.

Die P r o g n o s e des Brom. tuber. ist allgemein günstig zu stellen. Es sind in der Literatur nur einzelne letale Fälle bekannt. Bei allen anderen trat vollkommene Heilung ein, wobei nur Narben bei großen Bromodermknotten zurückblieben.

Die Therapie ist verhältnismäßig einfach.

Die Hauptsache ist, das Brom abzusetzen. Durch Zufuhr größerer Flüssigkeitsmengen kann man die Bromausscheidung erhöhen.

Dies wird man bei allen den Patienten tun, bei denen man die Bromtherapie nicht plötzlich absetzen darf, wie z. B. Epileptikern.

Weiter wird seit vielen Jahren bei Bromintoxikationen die Kochsalztherapie angewandt. Sie beruht auf der schon mehrmals erwähnten Verdrängung des Broms durch Chlor im Organismus. Normalerweise gibt man 5 bis 10 g Natriumchlorid pro die, am einfachsten per os.

Man kann natürlich auch Kochsalzinfusionen machen, wie z. B. W i l e sie eingeführt hat.

Er gab anfangs 100 bis 150 ccm physiologische Kochsalzlösung, allmählich 300 bis 400 ccm intravenös zweimal wöchentlich.

Es kann dabei durch die rasche Ausscheidung von Brom zu Nierenreizungen kommen. Man wird also in allen Fällen, wo der Verdacht auf Nierenschädigung besteht, und bei Hypertonie auf Infusion von Natriumchloridlösung verzichten. Per os wird Natriumchlorid stets gut vertragen. Weiter werden Umschläge mit physiologischer Kochsalzlösung und Kochsalzbäder mit gutem Erfolg angewandt.

F r e y behandelt Bromexantheme lokal mit Calciumchlorid 10%ig in Vaseline oder Lanolin oder Kalkwasser mit Erdnußöl zu gleichen Teilen; innerlich gibt er Kalk und Kochsalz.


H u e b f c h m a n n empfiehlt 3mal täglich einen Eßlöffel einer 20%igen Calciumchloridlösung und lokal Umschläge mit 5- bis 10%iger Calciumchlorid-Lösung oder 10%iger Calciumchlorid-Eucerinfalbe.

In besonders hartnäckigen Fällen haben E r i c h H o f f m a n n , F u ß und A r z t ganz gute Erfolge mit der Röntgentherapie erzielt. In der Mehrzahl der Fälle wird das Absetzen der Bromtherapie allein wohl genügen, ein Bromoderma zum Verschwinden zu bringen.

In dem von mir beobachteten Falle wurde lediglich das Brom abgesetzt. Der eklatante Erfolg ist aus beiliegenden Photos ersichtlich.

Aus der Literatur und dem von mir beobachteten Falle von Bromoderma Tuberosum läßt sich folgendes als Gesamtergebnis der Untersuchungen zusammenfassen:


1. Die Empfindlichkeit der Menschen gegen Brom ist abhängig vom Alter und der Gesamtkonstitution.
 2. Die Bromdosen, nach denen ein Bromoderm auftritt, sind infolgedessen auch verschieden.
 3. Brom und Chlor verdrängen sich gegenseitig im Körper.
 4. Die Prognose bei Bromoderma tuberosum ist allgemein günstig.
 5. Die Behandlung von Bromdermatosen besteht in der Beseitigung des Broms aus dem Organismus.
-




7. 1. 35



22. 1. 35



2. 2. 35



23. 3. 35

Literatur:

- Adler: Tuberöses Bromexanthem, Dermatol. 49 (1909).
- Alenk wist: Bromoderma (1928) Zbl. 27.
- Arzt und Fuß: Röntgen- und Hauttherapie (1925).
- Balint, G.: Bromoderma vegetans (1928), Zbl. f. H. K. 30.
- Bechet: Bromoderma, Zbl. f. H. K. 19, 245; 22, 525; 24, 813.
- Bernhard R. und Potrozobowski, K.: Arch. f. Dermatol. und Syph. Bd. 171 H. 1, S. 112.
- Bloch und Tenchio, Arch. f. Dermatol. 165, H. 1, S. 93—148 (1932).
- Bloch, Bruns: Zur Pathogenese des Bromoderma. Ceská Dermatol. Samberger Festschrift 1931.
- Bothe, Bromoderma tuberosum, Zbl. 38, 448.
- Brocq: a) Dermatologie pratique, b) Über eine unbekannte ulcerös vegetierende Krankheit (Pseudobromid), Annal. de Dermatol. 1918/19.
- Frey, E.: Med. Kl. 1914 Nr. 9.
- Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten Bd. 4/2. S. 256—72.
- Hoffmann, E., D. med. Wschr. 1919 Nr. 37. Ref.
- Kumer, L.: Zbl. f. H. K. 3, 340. Ref.
- Manuiloff, Dermatolog. Wschr. 55, 1646 (1912). Ref.
- Milian, G.: Zbl. 19, 655.
- Sander: Zbl. 37, 75 (1931). Ref.
- Scholz-Sanderbeck, Zbl. 14, 162. Ref.
- Wile: Zbl. 11, 43 u. 25, 321. Ref.
-

Lebenslauf.

Als Sohn des Volksschullehrers Franz Löllmann wurde ich, Theodor Löllmann, am 17. April 1907 in Kaifenheim, Kr. Kochem, geboren. Vom 6. bis 14. Lebensjahr besuchte ich die Volksschule in meinem Heimatort. Anschließend kam ich auf die deutsche Oberschule in Aufbauform in Wittlich und legte Ostern 1928 die Reifeprüfung ab. Vom SS. 1928 bis SS. 1934 studierte ich Medizin in Bonn, Freiburg, Bonn, Wien, München, Wien und Bonn. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich Ende SS. 1930 in Bonn, das ärztliche Staatsexamen Ende Juni 1934 ebenfalls in Bonn. Während des Praktikantenjahres war ich sieben Monate an der Mediz. Univ.-Klinik und fünf Monate an der Bonner Univ.-Hautklinik tätig. Meine Approbation als Arzt erhielt ich am 1. Oktober 1935.
